

Jak aplikovat ROOTFiX™?

Způsob aplikace: aplikace na osivo v mořícím zařízení

Aplikační dávka: 4 l/t osiva

Složení: 5×10^8 KTJ/ml *Bacillus spp.*

Doporučení pro aplikaci na osivo a výsev:

- Před použitím přípravek v plastovém vaku dobře promíchejte protřepáním
- Aplikujte na osivo v mořícím zařízení v požadované dávce (4 l/t)
- Zajistěte rovnoměrné pokrytí osiva
- Otevřené balení spotřebujte do 24 hodin po otevření originálního obalu
- Ošetřené osivo vysejte do 5 měsíců po namoření (při dodržení podmínek skladování)

Podmínky skladování prostředku ROOTFiX:

- Před aplikací výrobek z originálního obalu nevyjmíjte
- Skladujte při teplotě 5-15 °C
- Chraňte před mrazem
- Uložte v tmavých, suchých a dobře větraných prostorách
- Při dodržení skladovacích podmínek aplikujte do 12 měsíců od data výroby uvedeném na obalu

Osivo se prostředkem ROOTFiX očkuje postupně (sekvenčně) nebo v jednom kroku v kombinaci se slučitelným (kompatibilním) mořidlem*).

Při postupném (sekvenčním) očkování osiva se nejprve aplikuje prostředek ROOTFiX a po zaschnutí se osivo namoří.

Částečný přehled slučitelných (kompatibilních) mořidel:

- BASF: Kinto® Duo
- Bayer: Raxil® Star
- LG: Korit® Pro
- Syngenta: Vibrance® Duo
- UPL: Signal® 300

* Slučitelnost mořidel s prostředkem ROOTFiX lze spolehlivě prověřit v laboratoři výrobce prostřednictvím autorizovaného distributora.

Výrobce

Legume Technology Ltd.
člen skupiny Green Univers



+44 (0) 115 8240585

info@legumetechnology.co.uk
www.legumetechnology.co.uk

Autorizovaný distributor v České republice

Agrinova Consulting, s.r.o.
člen skupiny Agrinova Group



+420 775 391 431

info@agrinova.cz



www.agrinova.cz